

如果您發燒至 100.4°F (38°C) 或更高溫度：

1. **立即致電您的腫瘤醫生**—即便是在週末、節假日或半夜。
未經您的醫生允許，請勿服用退燒藥，例如：阿司匹林、對乙酰氨基酚 (Tylenol)、布洛芬 (Advil、Motrin) 或萘普生 (Aleve)。
2. 如果您在 20 分鐘內未接到來電，請前往最近的急診科 (Emergency Department, ED)。再次致電您醫生的診室，並告知他們您前往的 ED 在處。
3. 如果您打算前往 ED，請在您抵達時告知 ED 登記人員和分診護士以下事項：
 - 您正在接受腫瘤治療
 - 治療您腫瘤醫生的姓名
 - 您正在發燒且情況緊急



如果您正在發燒，請確保立即告知 ED 登記人員和分診護士。發燒表示您出現了感染現象。這是危及生命的情況，您應該及時得到就診。

如果您的醫生認為您的病情非常嚴峻，他們可能會告知您乘坐救護車前往 ED 就診。如果情況如此，這全然出自對您的安全而考慮。

請勿忘記向 ED 醫務人員提供您藥物清單的副本。

我的醫生： _____

我醫生的電話號碼： _____

如遇任何自己認為需要急診服務的情況，請致電 911。

如果您在非醫生診室服務時間內致電，您將被接通至我們的電話應答服務。如果您在營業時間外（週末或節假日）無法聯絡 UH Seidman Cancer Center，您可以直接聯絡電話應答服務，電話：1-877-669-2902。

2023 年 8 月

如果您有以下情況，請立即致電您的醫生：



出現感染病兆的情況可能包括如下：

- 發燒至 100.4°F (38°C) 或更高溫度
- 新出現的顫抖、發冷或出汗情況，或這些情況遭到惡化。
- 任何部位（包括傷口、輸液口和輸液部位）出現泛紅、酸痛、流膿、疼痛或腫脹
- 新出現呼吸急促或情況惡化
- 皮膚上出現皮疹或新的潰瘍
- 出現喉嚨痛、新的口腔潰瘍或口腔白斑
- 鼻竇疼痛、悶脹或鼻塞
- 惡心（嘔吐）
- 尿血或尿液渾濁
- 尿頻、尿痛或小便伴有灼燒感
- 新出現咳嗽、咳嗽癥狀改變或咳嗽伴有綠色或黃色粘液（痰）
- 陰道分泌物異常或瘙癢
- 脖子僵硬
- 24 小時內排出 3 次或 3 次以上的稀水樣大便（腹瀉）
- 新出現疼痛感
- 意識不清、昏昏欲睡或無原由地感到不安

其他需要致電您醫生的原因：

- 無法進食或進水長達 12 小時
- 顧慮或問題
- 新出現的流血情況或瘀血
- 新出現的症狀或副作用，或其遭到惡化
- 新出現的皮膚變化，皮疹或水泡



如遇任何自己認為需要急診服務的情況，請致電 911。